

秋冬起銹病，防治未銹斗！

(紅菇)

《三大特點，一次滿足！》

1

殺菌範圍廣，
銹病、炭疽病、
白粉病皆適用。

2

具滲透移行效果，
葉面吸收、
全株滲透分佈。

3

水基乳劑，
環保配方，
對作物更安全！



惠光化學股份有限公司

股票代號：6508

721 台南縣麻豆鎮苓子林17-10號 電話：06-570-2181 傳真：06-570-0065
www.huikwang.com hkc@huikwang.com

未銹斗特點

- 廣效性（銹病、炭疽病、白粉病）
- 系統性強，施用後迅速滲透移行
- 水基乳劑環保配方，對作物安全



水稻紋枯病



西瓜炭疽病

植保手冊正式登記用法

得克利25.9%EW單劑

作物	病害	每公頃每次用藥量	稀釋倍數	使用時期	施用次數	安採全期
柿	炭疽病	--	2,000	幼果期	2次	21天
洋香瓜	白粉病	0.3 - 0.4公升	3,000	發病初期	3次	6天
茶	赤葉枯病	0.4公升	2,500	採茶後7天開始	2次	15天
乾豆類	銹病	0.5公升	2,000	播種後如發現病斑時即施藥	4次	6天
梨	赤星病	--	2,500	發病初期開始施藥	4次	7天
落花生	銹病	0.5公升	2,000	播種後發現病斑時	4次	18天
蓮霧	炭疽病	--	2,000	開花初期開始施藥	1次	7天
檬果	炭疽病	--	1,500	發病初期開始使用	5-6次	6天

得克利 + 賓克隆 混合劑

作物	病害	每公頃每次用藥量	稀釋倍數	使用時期	施用次數	安採全期
水稻	紋枯病	0.5公升	2,000	插秧後45-50天	2次	14天
西瓜	炭疽病	0.7-1.0公升	1,500	發病初期	3次	6天



柿炭疽病



蓮霧炭疽病



洋香瓜白粉病



落花生銹病



芒果炭疽病

(內部技術資料，請勿外流)