




# 雷青蟲，金燦燦！

Q Q 蓋 好 溶 有 效 尚 要 緊



它牌藥劑易結塊



金燦燦藥劑顆粒均勻又QQ



溶解快速



稍加攪拌搖晃，完全溶解



**惠光化學股份有限公司**

721 台南縣麻豆鎮苓子林17-10號 電話：06-570-2181 傳真：06-570-0065  
www.huikwang.com hkc@huikwang.com

# 金燦燦<sup>®</sup> 特性：

## ◎速效

藥效比傳統藥劑快速，立即見效！

## ◎用量低

用量低效果佳，僅需傳統藥劑的  
1/500~1/3000，即可達到相同防治效果。

## ◎新型作用機制，對人畜安全


大自然土壤微生物發酵後的產物，安全性高。

## ◎具滲透移行性

可從根部吸收，對潛入蔥管危害的甜菜夜蛾具特效。

## ◎安全採收期短

對農民及消費者均便利安全。



## ◎植保手冊推薦因滅汀5%SG防治方法：

作物	適用害蟲	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	使用時期	安全採收期
毛豆	甜菜夜蛾	0.3-0.4公斤	4,000	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天用藥一次	3天
甘藍	小菜蛾	0.15-0.2公斤	5,000	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天用藥一次	9天
洋香瓜	甜菜夜蛾	0.2-0.3公斤	4,000	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天用藥一次	6天
蔥	甜菜夜蛾	0.2公斤	5,000	害蟲發生初期開始施藥，每隔7天用藥一次	9天

## ◎國外參考資料：(因滅汀2%EC)

作物	害蟲	稀釋倍數	使用次數	國外安全採收期
柑橘	薊馬、潛葉蛾	1000~2000	2次以內	3天
豆類	葉潛蠅	2000	2次以內	3天
西瓜	南黃薊馬	1000~2000	3次以內	3天
胡瓜	瓜螟、南黃薊馬、葉潛蠅	2000	3次以內	3天
洋香瓜	南黃薊馬、葉潛蠅	1000~2000	2次以內	6天
蕃茄	葉潛蠅、蕃茄銹蟎	2000	5次以內	1天
茄子	薊馬類、細蟎、葉蟎	2000	2次以內	1天
胡蘿蔔	潛蠅	2000	3次以內	1天
草莓	葉蟎	2000	2次以內	1天
觀賞花卉	薊馬類、葉潛蠅	1000~2000	5次以內	--