

日本原裝進口

# 防治稻熱病(吊穗)推薦藥劑！

使用「**富穗旺**」讓您收成旺、旺、旺！



◎適用範圍及使用方法：

作物名	病害名	每公頃施用藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
水稻	葉稻熱病	0.67-1公斤	1000-1500倍	--	1. 本藥劑試驗時加展著劑「新利農」3,000倍。 2. 收割前7天停止施藥。
	穗稻熱病	0.8-1.2公斤	1000-1500倍	--	
	育苗箱秧苗 稻熱病	20公克/5株	25倍	秧苗綠化初期稀釋水量500公撮，以澆水器均勻灑在育苗箱內。	--
梨	白紋羽病	25公克/5株	--	於病區罹病株更新前一星期施藥於土壤內部。	1. 先行徹底清除病株殘根。 2. 施藥範圍為35公分，範圍加大需酌予增加藥量。 3. 對眼具刺激性。



惠光化學股份有限公司


股票代號：6508

721 台南縣麻豆鎮荳荖子林17-10號 電話：06-570-2181 傳真：06-570-0065  
www.huikwang.com hkc@huikwang.com


榮獲 ISO9001  
ISO14001 驗證

# 富穗旺產品特性


對稻熱病菌整個生活環都有效



# 正確使用時機



# 具系統性，效果持久！



# 與其他藥劑比較

藥劑名	富穗旺	喜X生	喜X仁-P	益X	嘉賜X素
預防效果	++	+	+	++	無
治療效果	+	+	+	無	++
殘效期間	2星期	1星期	1星期	2星期	3天
根部系統性	++	無	++	++	+
移行滲透性	++	+	++	++	+
附加效果	PGR	無	無	無	無

※附註 ++：效果優，+：普通、無：無效果

# 附加價值：具PGR (植物生長調節劑) 功效！

- 蕃茄 促進植株生長及根系發達，延長採收期
- 蘋果 促進植株生長及根系發達
- 花卉 加速幼芽及嫩枝分化，促進根系發達，花色鮮豔
- 草莓 增加根系活力，延長採收期間
- 大蒜 增加重量
- 洋蔥 增加產量
- 茄子 增加活力，減少落花，提昇產量，延長收穫期

- 觀賞植物 促進開根
- 蘆筍 增加嫩芽數目
- 青椒 促進根系發育，增加產量
- 馬鈴薯 增加產量
- 大豆 增加產量
- 柑桔 促進植株活力
- 水稻 促進根系發達，增加分蘗數及產量