

速效強攻蟲倒倒[®]



來自大自然微生物發酵的殺蟲劑



青蟲
(紋白蝶)



蔥仔管蟲
(甜菜夜蛾)



吊絲仔
(小菜蛾)



惠光化學股份有限公司

股票代號：6508

721 台南縣麻豆鎮苓子林17-10號 電話：06-570-2181 傳真：06-570-0065

www.huikwang.com hkc@huikwang.com

蟲倒倒特性

◎速效

藥效比傳統藥劑快速，立即見效！

◎用量低

用量低效果佳，僅需傳統藥劑的
1/500~1/3000，即可達到相同防治效果。

◎新型作用機制，對人畜安全

大自然土壤微生物發酵後的產物，安全性高。

◎具滲透移行性


可從根部吸收，對潛入蔥管危害的甜菜夜蛾具特效。

◎安全採收期短

對農民及消費者均便利安全。

◎防治對象：

《國內正式登記》



作物	適用害蟲	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥方法	注意事項
甘藍	紋白蝶	0.4-0.6公升	2,000	蟲害發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1. 採收前6天停止施藥。 2. 具中度皮膚刺激性、強眼睛刺激性。 3. 對鳥類具神經毒性；對靈性及水生生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
甘藍	小菜蛾	0.4-0.5公升	2000	蟲害發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1. 本劑試驗時加展著劑「CS-7」3000倍。 2. 包葉菜類採收前18天停止施藥。 3. 小葉菜類採收前6天停止施藥。
蔥	甜菜夜蛾	0.6-0.8公升	1500	蟲害發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1. 本劑試驗時加展著劑「CS-7」3000倍。 2. 採收前6天停止施藥。 3. 具中度皮膚刺激性、強眼睛刺激性。 4. 對鳥類具神經毒性；對蜜蜂及水生生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。

《國外參考資料》

作物	害蟲	稀釋倍數	使用次數	國外安全採收期
柑橘	薊馬、潛葉蛾	1000~2000	2次以內	3天
豆類	葉潛蠅	2000	2次以內	3天
西瓜	南黃薊馬	1000~2000	3次以內	3天
胡瓜	瓜螟、南黃薊馬、葉潛蠅	2000	3次以內	3天
洋香瓜	南黃薊馬、葉潛蠅	1000~2000	2次以內	6天
蕃茄	葉潛蠅、蕃茄銹蟎	2000	5次以內	1天
茄子	薊馬類、細蟎、葉蟎	2000	2次以內	1天
胡蘿蔔	潛蠅	2000	3次以內	1天
草莓	葉蟎	2000	2次以內	1天
觀賞花卉	薊馬類、葉潛蠅	1000~2000	5次以內	--

內部技術資料，請勿外流！