

鐵金剛 出動·害蟲拼嘍撞!

給黃條葉蚤致命的一拳!



十字花科蔬菜黃條葉蚤

針對蘿蔔、包心白菜、小白菜
效果最佳藥效快!

日本三井
原裝進口



鐵金剛 20% 水溶性 (達特南) 粒劑

植物保護藥劑的劃時代之星



惠光化學股份有限公司

721 台南縣麻豆鎮苓子林17-10號 電話：06-570-2181 傳真：06-570-0065
www.huikwang.com hkc@huikwang.com

榮獲ISO 9001及14001驗證

《公司內部資料·請勿流出》

黃條葉蚤(黑跳龜仔)您知多少? 鐵金剛幫您來徹底解決!

危害：

1. 黃條葉蚤成蟲危害葉片，幼蟲啃食地下根及塊根。
2. 殺除成蟲只是做了一半的防治，地下幼蟲仍繼續危害，很快再轉變為成蟲爬出，再度侵害繁衍。

結論：

1. 黃條葉蚤耐藥性強，一般藥劑效果差。
2. 要徹底完全防治黃條葉蚤，必需成蟲、幼蟲一起殺。


鐵金剛是防治黃條葉蚤最佳選擇！

特點：

1. 鐵金剛對黃條葉蚤成蟲、幼蟲具有觸殺擊倒及強胃毒功效。
2. 鐵金剛對作物有極高安全性。

使用方法：

作物	方法
蘿蔔	出苗期淋灌一次(200倍)，每隔10天葉面均勻噴施。
小白菜	穴盤苗期灌注(200倍)，苗期淋灌一次(200倍)，10天後再行均勻噴施一次。
包心白菜	移栽後灌注一次(200倍)，每隔10-14天葉面均勻噴施。



黃條葉蚤生活史



鐵金剛防治包心白菜黃條葉蚤田間試驗資料



- 試驗作物：包心白菜
- 試驗地點：屏東縣萬丹鄉
- 試驗時機：種植前一天
- 施藥方式：穴盤澆灌法
- 施藥用量：100倍及200倍

施藥後第六天調查結果

處理別	調查株數	被害株數	控制率
鐵金剛20%SG 100倍澆灌	200	1	97.8%
鐵金剛20%SG 200倍澆灌	200	1	97.8%
未處理組	200	46	—

施藥後第六天調查結果

